01 / FAMAVERA RESEARCH

Wynik i zakres

Czy szczepionki przeciw polio skażone SV40 wywołały epidemię nowotworów?

Raport do FC-HEA-2026W41-004 · v2 ROBOCZY · status: ROBOCZY — DO AKCEPTACJI · aktualność sprawdzona do: 11.10.2026 17:03 CEST

POLE	WARTOŚĆ
Werdykt	WPROWADZA W BŁĄD — proponowany
Pewność	95% — propozycja
Teza	RFK Jr. twierdzi, że szczepionki przeciw polio skażone SV40 trafiły do ok. 98 mln ludzi, po czym nastąpiła eksplozja nowotworów tkanek miękkich, która zabiła więcej ludzi niż polio.
Zakres	Historyczny SV40 w polio (USA, 1955–1963); wypowiedź RFK z 06.07.2023; bez ekstrapolacji na obecne szczepionki/COVID.
Odpowiedź w skrócie	Część szczepionek przeciw polio stosowanych w USA w latach 1955–1963 rzeczywiście była skażona SV40. Liczba 98 mln dotyczy jednak zaszczepionych, a nie potwierdzonych odbiorców skażonej dawki; szacunek 10–30 mln potencjalnie narażonych jest niepewny. Badania epidemiologiczne nie wykazały masowej epidemii nowotworów wywołanej skażeniem i nie dostarczają porównywalnego bilansu zgonów. Jednocześnie nie pozwalają wykluczyć każdego możliwego indywidualnego skutku; RFK na pytanie o bilans netto odpowiedział „I don't know".

02 / FAMAVERA RESEARCH

Mapa twierdzeń

Twierdzenie	Pytanie kontrolne	Wynik	Dowód rozstrzygający	Ograniczenie
Kontaminacja	Czy szczepionki zawierały SV40?	TAK	CDC 2024, sekcja SV40	Dotyczy części dawnych partii USA.
98 mln	Czy tyle osób dostało skażone preparaty?	NIE WYKAZANO	IOM 2002, „Exposure to SV40"	98 mln to wszyscy zaszczepieni; szacunek ekspozycji niepewny.
Rakotwórczość	Czy SV40 dowodnie wywołał raka u ludzi?	NIEUSTALONE	IARC 2013, sekcja 6	Grupa 3 ≠ absolutny brak ryzyka.
Epidemia raka	Czy kohorty wykazują masowy efekt?	NIE POTWIERDZAJĄ	JAMA 1998, Dania 2003	W podgrupach pojedyncze dodatnie sygnały.
Bilans zgonów	Czy zgony nowotworowe przeważyły zgony polio?	BRAK DANYCH	RFK „I don't know"; CDC polio	Brak przypisanej przyczynowo liczby nowotworów.

03 / FAMAVERA RESEARCH

Dowody rozstrzygające

Dowody poniżej pochodzą z kart audytowych DRAFT i źródeł pierwotnych. Ich zatwierdzenie następuje dopiero po decyzji redaktora FAMAVERA.

#	Źródło	Dokładne miejsce	Zakres dowodu	Wniosek	Link
1	Transkrypcja RFK	01:56:11–01:57:02	Dosłowny claim	„Explosion” i nieznany bilans	https://lexfridman.com/robert-f-kennedy-jr-transcript/
2	CDC 2024	SV40: 1955–1963	Historyczne partie	10–30% preparatów skażonych	https://www.cdc.gov/vaccine-safety/historical-concerns/index.html
3	IOM 2002	Exposure to SV40	Denominator	98 mln vs 10–30 mln	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221112/
4	IARC 2013	Vol.104, rozdz.6	Dane zwierzęta/ludzie	Grupa 3	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK294242/?report=reader
5	JAMA 1998	Results	Kohorty USA	Brak wzrostu wybranych guzów	https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/187182

04 / FAMAVERA RESEARCH

Test przeciwny

Hipoteza przeciwna	Co znaleziono	Wpływ na wniosek
Biologiczna możliwość	SV40 wywołuje guzy u zwierząt; wybrane DNA w guzach.	Utrzymać niepewność; brak dowodu epidemii w ludziach.
Dodatnie sygnały kohort	Fisher 1999, ependymoma Dania RR=2,59 w podgrupie.	Wymagają ostrożnej interpretacji; brak powtarzalnego efektu.
Ograniczenia badań ujemnych	Pośrednie narażenie i długi czas latencji.	Nie wykluczają wszystkich indywidualnych przypadków.
Zgony SV40 vs polio	Brak identyfikowalnej liczby zgonów przyczynowych.	Nie wykonuj arytmetycznego bilansu bez obu składników.

Warunki zmiany oceny

Nowa wiarygodna kohorta z potwierdzoną ekspozycją wykazująca istotny, powtarzalny wzrost nowotworów; nowy niezależny bilans przyczynowych zgonów; nowa klasyfikacja IARC; autentyczna korekta wypowiedzi RFK.

05 / FAMAVERA RESEARCH

Analiza szczegółowa

Twierdzenie / moduł analizy

CDC: w latach 1955–1963 szacunkowo 10–30% szczepionek polio podawanych w USA było skażonych, głównie IPV, częściowo OPV. IOM: około 98 mln zaszczepionych IPV, 10–30 mln potencjalnych ekspozycji na żywy SV40; nie są to infekcje ani nowotwory. JAMA 1998 i kohorty duńskie z 2003 r. nie wykazały podwyższenia ogólnego ryzyka. W testach przeciwnych uwzględniono dodatnie sygnały molekularne oraz podgrupę wyściółczaka w Danii (RR=2,59). IARC: dowody u ludzi niewystarczające; u zwierząt wystarczające; SV40 grupa 3. Brak danych do wyliczenia liczby zgonów na nowotwory przyczynowo spowodowane SV40 z historycznych szczepionek.

Obliczenia i rozbieżności

Kontrola	Dane i wzór	Wynik	Granica / porównywalność
98 mln vs 10–30 mln	IOM: osoby zaszczepione vs potencjalnie narażone	Rozdzielić	Brak kompletu partii; nie jest to odsetek potwierdzonych zakażeń.
RR ependymoma USA	JAMA 1998: RR 1,06; CI 0,69–1,63	Brak istotnej nadwyżki	CI obejmuje 1; pośrednia ekspozycja.
RR wszystkich raków Dania	JNCI 2003: 0,86 i 0,79 w kohortach potencjalnie narażonych	Brak wzrostu ogółem	RR 2,59 w rzadkiej podgrupie wymaga zaznaczenia.
Historyczne polio	CDC: 1879 zgonów rocznie 1951–1954	Nie jest bilansem zapobieżonych zgonów	Różne horyzonty i populacje.

Materiał graficzny / wizualny

NIE DOTYCZY: badanie dotyczy wypowiedzi tekstowo-dźwiękowej, nie autentyczności obrazu. Oryginalny odcinek i transkrypcja są materiałem źródłowym.

06 / FAMAVERA RESEARCH

Rejestr źródeł

#	Klasa	Źródło	Data	Dokładne miejsce	Rola	Ograniczenie	Link
1	A	Lex Fridman	2023	01:56:11–01:57:02	Źródłowy claim	Transkrypcja może mieć błędy	https://lexfridman.com/robert-f-kennedy-jr-transcript/
2	A	CDC	2024	Sekcja SV40	Historyczne skażenie	Synteza urzędowa	https://www.cdc.gov/vaccine-safety/historical-concerns/index.html
3	A	IOM	2002	Exposure to SV40	98 mln i 10–30 mln	Brak partii	https://www.ncbi.n

							lm.nih.gov/books/NBK221112/
4	A	IARC	2013	Rozdział 6	Grupa 3	Nie wyklucza ryzyka	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK294242/?report=reader
5	A	JAMA	1998	Results	Kohorty USA	Pośrednia ekspozycja	https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/187182
6	A	JNCI Dania	2003	Abstract	69,5 mln osobolat	Wyjątek podgrupy	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12671021/
7	A	Oncogene	2004	Abstract	Metaanaliza pięciu badań	Rzadkie nowotwory	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15322523/
8	A	CDC MMWR	1999	Polio	1879 zgonów rocznie	Nie uniknięte zgony	https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056803.htm

07 / FAMAVERA RESEARCH

Ograniczenia i aktualizacje

Ograniczenia

98 mln zaszczepionych ≠ liczba narażonych ≠ liczba zakażonych. Historyczne serie partii nie są kompletne. Badania kohort wykorzystują pośrednie wskaźniki ekspozycji i mają ograniczoną moc dla rzadkich nowotworów. Grupa IARC 3 nie potwierdza bezpieczeństwa absolutnego. Nie da się obliczyć bilansu zgonów. Oddzielny wariant dotyczący COVID-19 wykluczono bez niezależnego claim anchoru.

Aktualność i dokumenty nowsze / powiązane

Oddzielne wyszukiwanie 11.10.2026 17:03 CEST: kontrola CDC (aktualizacja 31.07.2024), IOM 2002, IARC 2013, kohort USA/Dania oraz przeglądów i prac z lat 2025–2026. Brak znalezionego dokumentu zmieniającego ocenę. Nie traktować braku wyniku wyszukiwania jako dowodu braku każdego nowego badania.

Co wymaga aktualizacji raportu

Nowa publikacja kohortowa z udokumentowanym narażeniem, korekta IARC/CDC, pierwotne źródło z danymi przyczynowo przypisanych zgonów, wiarygodna korekta wypowiedzi autora.

08 / FAMAVERA RESEARCH

Jak cytować

FAMAVERA, „Czy szczepionki przeciw polio skażone SV40 wywołały epidemię nowotworów?”, FC-HEA-2026W41-004, v1 ROBOCZY, aktualność: 11.10.2026 17:03 CEST. Cytując ustalenia, podawaj właściwy dokument i sekcję z rejestru źródeł.

Identyfikator wersji

FC: FC-HEA-2026W41-004
Wersja raportu: v2 ROBOCZY
Źródłowy snapshot: SRC-HEA004-RESEARCH-EWM-20261010-AUDIT-20261011
Data wydania: 11.10.2026 — wersja robocza

Zasada źródłowa

Cytując konkretną liczbę lub ustalenie, należy wskazać również źródło z rejestru i jego dokładne miejsce. Raport zawiera wyłącznie zatwierdzone ustalenia przeznaczone dla odbiorcy oraz informacje potrzebne do prześledzenia podstawy wniosków.